



สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต 6 จังหวัดระยอง



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี



สำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข

ภาวะโลหิตจาง


(ในเด็ก 6 เดือน – 2 ปี) ปี 2563

เขตสุขภาพที่ 6



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนบุรี


เด็กอายุ 6 เดือน – 11 เดือน 29 วัน ได้รับการเจาะ Hematocrit





กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ร้อยละภาวะโลหิตจางที่ได้รับการตรวจ Hematocrit ก่อนการรักษา



$$\text{ร้อยละภาวะโลหิตจางที่ได้รับการตรวจ Hct ก่อนการรักษา} = \frac{\text{ผลเจาะ Hct ที่ผิดปกติ} \times 100}{\text{จำนวนคนที่เจาะ Hct ทั้งหมด}}$$

หมายเหตุ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60,115 คน จำนวนเด็กที่ได้รับการเจาะ Hct ร้อยละ 48.3




กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนบุรี

ภาวะโลหิตจางหลังได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก



$$\text{ภาวะโลหิตจางหลังได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก} = \frac{(\text{เจาะซ้ำไม่พบภาวะซีด} - 100) \times \text{ร้อยละของภาวะโลหิตจาง}}{100}$$




กลุ่มวัยรุ่น

การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่


การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร

การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี รายเขตสุขภาพ ปี 2563




การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับประเทศพบร้อยละ 14.02 เขตสุขภาพที่มีการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นน้อยที่สุด คือเขตสุขภาพที่ 3 พบร้อยละ 11.61 รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 10 และ 9 พบร้อยละ 11.99 และ 12.19 ตามลำดับ ส่วนเขตสุขภาพที่ 6 พบร้อยละ 14.02 อยู่อันดับที่ 6 จาก 12 เขต

หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง รายเขตสุขภาพ ปี 2563




หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ปี 2563 ระดับประเทศพบร้อยละ 40.4 เขตสุขภาพที่มีหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่มากที่สุด คือเขตสุขภาพที่ 6 ร้อยละ 61.8 รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 5 และ 3 พบร้อยละ 55.2 และ 54.7 ตามลำดับ

หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร รายเขตสุขภาพ ปี2563



หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรปี 2563 ระดับประเทศ พบร้อยละ 68.6 เขตสุขภาพที่มีหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี คุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรมากที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 79.9 รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 4 และ 11 พบร้อยละ 79.0 และ 77.6 ตามลำดับ ส่วนเขตสุขภาพที่ 6 พบร้อยละ 75.8 ซึ่งอยู่อันดับที่ 4 จาก 12 เขต


การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563



การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับเขตสุขภาพที่ 6 พบร้อยละ 14.02 จังหวัดจะเชิงเทราพบน้อยที่สุด ร้อยละ 10.69 รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรีและสระแก้ว พบร้อยละ 12.30 และ 13.16 ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่พบมากที่สุดคือจังหวัดระยอง ร้อยละ 16.63


ที่มา : HDC วันที่ 5/8/2563

หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563



หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้งปี 2563 ระดับเขตสุขภาพที่ 6 พบร้อยละ 61.79 พบมากที่สุด จังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 82.06 รองลงมาคือจังหวัดตรังและชลบุรี พบร้อยละ 75.95 และ 73.24 ตามลำดับ

หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563



หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรปี 2563 ระดับเขตสุขภาพที่ 6 พบร้อยละ 75.96 พบมากที่สุดคือจังหวัดตราด ร้อยละ 98.33 รองลงมาคือจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา พบร้อยละ 83.97 และ 82.46 ตามลำดับ