

เดือนวัยรุ่น ใส่กางเกงเล็คกิ้งสีดำ เสี่ยงต่อการป่วยเป็นไข้เลือดออก



สร.เดือนวัยรุ่นใส่ กางเกงเล็คกิ้งสีดำ เสี่ยงต่อการป่วย
ไข้เลือดออก

(สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์) โดย ชรินทร์า คงเอียด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดือนวัยรุ่นที่ชอบใส่
“กางเกงเล็คกิ้งสีดำ” เสี่ยงต่อการป่วยไข้เลือดออก

ดร.พรรณ สิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้น่าห่วงมาก จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปี
ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 40 ตั้งแต่เดือนมกราคม -30 กรกฎาคม
2553 ทั่วประเทศมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 45,379 ราย
เสียชีวิต 43 ราย โดยพบผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ มากที่สุดคือกลุ่มเด็กโต

ถึงวัยรุ่น อายุ 10-24 ปี พบร้อยละ 52 โดยมีรายงานพบเด็กแรกเกิดอายุต่ำกว่า 28 วัน ป่วยจำนวน 7 ราย ผู้สูงอายุ
65 ปีขึ้นไปป่วย 322 ราย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า เรื่องที่น่าห่วงคือการแต่งตัวของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นทั้งเขตเมืองและชนบท ที่นิยมแฟชั่นเล็คกิ้งหรือกางเกงใส่กันโป๊ ซึ่งเป็นกระแสแฟชั่นฮิตจาก
เกาหลี ที่นิยมมากที่สุดคือสีดำ ซึ่งเป็นสีที่ยุงลายชอบ และยุงชนิดนี้จะออกหากินช่วงกลางวันอยู่แล้ว หากยุงที่กัด
มีเชื้อไข้เลือดออกก็จะทำให้ติดเชื้อและป่วยได้ จึงขอแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงใส่เสื้อผ้าสีโทนทึบ โทนดำ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการยั่วยวนยุงลาย ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายนทุกปี เป็นช่วงระบาดของไข้เลือดออก จะพบผู้ป่วย
ช่วงนี้มากที่สุด

ขณะนี้นิยมแฟชั่นเล็คกิ้งหรือกางเกงใส่กันโป๊ ซึ่งเป็นกระแสแฟชั่นฮิตจากเกาหลี มีลักษณะเป็นผ้ายืดมีทั้งขา
ยาว ขาสั้น ขาสีส่วน มีหลากหลายสีแบบขา แต่ที่นิยมมากที่สุดคือสีดำ ซึ่งเป็นสีที่ยุงลายชอบ และยุงชนิดนี้จะออกหากิน
ช่วงกลางวันอยู่แล้ว ทำให้ผู้ใส่มีความเสี่ยงถูกยุงลายซึ่งมีปากแหลมกัดเจาะผ่านรูผ้ายืดของ กางเกงเข้าไปได้เลือดได้
โดยง่าย หากยุงที่กัดมีเชื้อไข้เลือดออกก็จะทำให้ติดเชื้อและป่วยได้ จึงขอแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงใส่เสื้อผ้าสีโทน
ทึบ โทนดำ เพื่อหลีกเลี่ยงการยั่วยวนยุงลาย ควรเลือกใช้เสื้อผ้าสีอ่อนๆ สวมใส่กางเกงที่ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดได้ เช่น
กางเกงยีนส์ หรือกางเกงผ้าหนาๆ ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายนทุกปี เป็นช่วงระบาดของไข้เลือดออก จะพบ
ผู้ป่วยช่วงนี้มากที่สุด

เนื่องจากผลวิเคราะห์จากผู้ป่วยพบว่าร้อยละ 80 ถูกยุงลายในบ้านกัด ซึ่งแหล่งน้ำในบ้านที่มักมียุงลาย
วางไข่ ได้แก่ ถังน้ำ โอ่งน้ำ พบได้ร้อยละ 40 รองลงมาคือน้ำหล่อขาตู้กับข้าว แจกัน วิธีการลดปริมาณยุงลายที่ดีที่สุด
คือการทำลายลูกน้ำทุก 5-7 วันเพื่อไม่ให้มีโอกาสดโตเป็นยุงเต็มวัย หากบ้านเรือนทั้ง 22 ล้านครัวเรือนช่วยกัน มั่นใจ
ว่าปริมาณยุงลายตัวเต็มวัยจะลดลง เพราะยุง 1 ตัวจะมีอายุประมาณ 30-45 วัน ส่วนเรื่องการรักษาได้เน้นย้ำให้
แพทย์ พยาบาลทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐาน หากพบผู้ป่วยทุกอายุที่มีไข้สูง ขอให้รีบถึงโรคไข้เลือดออก และดูแล
ใกล้ชิด เพื่อลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

ที่มา : http://new109.blogspot.com/2010/08/blog-post_17.html

เรียบเรียง : งานวิจัยและเยาวชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3